

イトラコナゾール錠50「MEEK」・100「MEEK」

- Q** 爪白癬に対するパルス療法とは、どのような治療法ですか？
- A** 1回200mgを1日2回1週間経口投与し、その後3週間休薬する。これを1サイクルとし、3サイクル繰り返す治療法です。
- Q** パルス療法において、休薬期間中に併用禁忌薬剤を投与してもよいですか？
- A** 投与終了後も爪甲中に薬物が貯留するため、休薬期間中も併用禁忌薬剤の投与は行わないで下さい。
- Q** 爪白癬と足白癬を合併している場合、パルス療法と連日投与のどちらを選択すればよいですか？
- A** 爪白癬の方が治療期間が長く、投与量も多いため、パルス療法がよいと思います。
- Q** パルス療法の場合、1日400mgを投与することになりますが、安全性は大丈夫ですか？
- A** 1日200mg3サイクル群、1日200mg6サイクル群、1日400mg3サイクル群の比較試験において、副作用発現率に差は認められなかったという報告があります。
- Q** パルス療法について、患者向けの説明資料はありますか？
- A** パルス療法に関する患者用指導せんを提供させて頂いております。
- Q** 男性が飲む場合、避妊は必要ですか？
- A** 男性が使用した薬の妊娠への影響は基本的にはないと考えられるので、避妊の必要性はないと思われます。
- Q** 粉碎して投与してもよいですか？
- A** 本剤は特殊な製剤設計をしておりますので、粉碎は行わないで下さい。
- Q** 安定性については？
- A** PTP包装品又はポリエチレン容器入り、40℃・75%RH条件下で6箇月間、25℃で36箇月間安定でした。また、無包装状態では、60℃で30日、蛍光灯120万ルクス照射下で安定でした。